

## ZAŠTITA ZASADA ŠLJIVE, MALINE I KUPINE U FENOLOŠKOJ FAZI “ BUBRENJE PUPOLJAKA “



U fenološkoj fazi “bubrenje pupoljaka” u proizvodnim zasadima voća neopohodno je uraditi preventivni tretman u cilju suzbijanja prezimljavajućih oblika patogena (*prouzrokovaca biljnih bolesti*) i štetočina (*zimski jaja insekata i grinja*) primenom mineralnih ulja i bakarnih preparata.

### ***IZBOR PREPARATA***

- Crveno ulje(2-3%)
- Plavo ulje(2-3%)
- Ogriol (0,3-0,4%) + Flowbrix Blau(0,1-0,2%)
- Belo ulje (3-4%) u kombinaciji sa bakarnim preparatima(Bakaroksihlorid,Cuproxtat,Bakarni kreč,Bordovska čorba,Cuprazin,Nordox,Curzate.....)

### ***Napomene:***

- Tretiranje se vrši kada su stabla voćaka suva na temperaturi iznad 0°C
- Stabla je potrebno dobro i ravnomerno “okupati”
- Poštovati uputstvo za primenu preparata
- Koristiti lična zaštitna sredstva i ispravnu mehanizaciju u toku rada
- Na tretiranim površinama najmanje 28 dana od dana primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama
- Poštovati vodozaštitne zone prilikom tretiranja

*Dipl.ing. Vesna Janković*