

## СУШЕЊЕ ГРАНЧИЦА И ТРУЛЕЖ ПЛОВОА КОШТИЧАВОГ ВОЋА (*Monilia* sp.)

### Симптоми:

- ✓ на цветovima, ластарима, гранчицама и плодовима
- ✓ цветovi - постају мркосиве боје, суше се и опадају
- ✓ младари - део изнад заразе се суши и опада
- ✓ млађи плодови - некротирају, иструле и опадну
- ✓ старији плодови - труле, смежуравају се, суше и претварају у мумије које остају на крошњи или опадају
- ✓ на зараженим органима се уочава беличаста навлака конидија

### Критично за инфекцију:

- ✓ цветање, нарочито ако га прати влажно време
- ✓ оштећења плодова од инсеката, инсолације, хемикалија и других фактора доводи до интензивнијег развоја болести на плодовима

### Непестицидне мере заштите:

- ✓ при подизању воћњака бирати пропусне терене где је олакшано проветравање, а редове постављати у правцу доминантних ветрова ради боље аерације
- ✓ заражене гране и гранчице резивати 20 см испод сувог дела јер гљива продире дубоко у дрво (најбоље летњом резидбом, а не остављати за пролеће)
- ✓ орезане гране и гранчице, заједно са мумифицираним плодовима изнети ван воћњака и спалити

### Пестицидне мере заштите:

- ✓ употреба фунгицида у периоду мировања вегетације, пред цветање (бели балони), у пуном цветању и у прецветавању
- ✓ уколико је период цветања продужен и праћен влажним временом, потребно је још једно додатно третирање током цветања

### Доступни препарати:

- БАКАРНИ ПРЕПАРАТИ (за третирање у мировању),
- BENFUNGIN, BENOMIL WP-50, BENLATE 50-WP, у конц. 0,08-0,1%,
- RONILAN-DF, RONILAN-FL, у дози 1,5 kg(l)/ha,
- CHORUS 75-WG, у дози 0,2 kg/ha,
- AKORD, у дози 0,75 l/ha,
- BRAVO 720-SC, у дози 1,5-2 l/ha,
- SIGNUM, у дози 0,56-0,75 kg/ha,
- OCTAVE, у концентрацији 0,04%,
- SUMILEX 50-FL, у концентрацији од 0,15%,
- TOPSIN 70-WGR, у концентрацији од 0,07%

