


РАНО ПРОЛЕЋНО ТРЕТИРАЊЕ ВОЋАКА



бактериозна пламењача
јабуке и крушке (*Erwinia amylovora*)



пегавост лишћа и
краставости плодова
јабуке (*Venturia inaequalis*)



коврџавост листа брескве
(*Taphrina deformans*)



монилиозе коштичавог
воћа (*Monilia sp.*)

Неопходно за контролу болести:

- ✓ коврџавост листа брескве
- ✓ бактериозна пламењача јабуке и крушке
- ✓ пегавост лишћа и краставост плодова јабуке и крушке
- ✓ рогач шљиве
- ✓ монилиозе коштичавог воћа
- ✓ шупљикавост лишћа коштичавог воћа
- ✓ љубичаста (кестењаста) пегавост малине

Препарати на тржишту:

- ✓ BLAUVIT, BLAUVIT TEČNI
- ✓ BAKARNI OKSILORID-25, BAKROCID-25, BAKARNI OKSILORID-50, BAKROCID-50, BEVVEBLAU KREČ
- ✓ KUPRAGRIN
- ✓ PLAVI KAMEN – ZORKA, PLAVI KAMEN – ŽUPA
- ✓ BORDOVSKA ČORBA WP-20, BORDOVSKA ČORBA S-20 ŽUPA
- ✓ CIRAM S-75, FITOCIRAM

Услови третирања:

- ✓ пре кретања вегетације
- ✓ суво време без ветра са темп. >7°C
- ✓ целе воћке добро окупати

Мешање са минералним уљима за контролу штеточина:

- ✓ ваши (лисне, штитасте)
- ✓ крвава ваш
- ✓ крушкина бува
- ✓ цветоједи
- ✓ мољци (јабукин, шљивин, бресквин)
- ✓ смотавци
- ✓ мразовци
- ✓ кукавичија суза
- ✓ губар
- ✓ црвена воћна гриња

Минерална уља на тржишту:

- ✓ GALMIN, BELOL, BELO ULJE, BELO ULJE-EW, EOS
- ✓ DAST OIL
- ✓ CRVENO ULJE (готова комбинација са бакром)



шупљикавост лишћа
коштичавог воћа
(*Clasterosporium
carpophilum (Stigmia
carpophila)*)



љубичаста (кестењаста)
пегавост малине
(*Dydimella applanata*)



крушкина бува (*Cacopsylla
sp.*)



црвена воћна гриња
(*Panonychus ulmi*)