

КОВРЦАВОСТ ЛИШЋА БРЕСКВЕ (Taphrina deformans)

Симптоми:

- ✓ Месец дана након инфекције
- ✓ На лишћу, младарима, цвету и плоду
- ✓ Најзначајнији на лишћу: задебљава, деформише се, набора и исковрца
- ✓ Ободели делови губе хлорофил, постају зеленожути, а код неких сорти црвенољубичасти
- ✓ Крајем пролећа сивкаста превлака на оболелом лишћу
- ✓ Ободело лишће опада

Последице:

- ✓ Слабији принос (опадање лишћа проузрокује губитак плодова)
- ✓ Воћка слаби, па је осетљивија на ниске температуре зими и заразе другим патогенима
- ✓ Смањено формирање плодова за наредну годину или дужи период

Осетљива фаза:

- ✓ Од бубрења до отварања пупољака

Када хемијски третирати:

- ✓ У јесен, након опадања лишћа или у пролеће након обављене резидбе, а пре кретања вегетације (суво време без ветра са темп. $>7^{\circ}\text{C}$, целе воћке добро окупати) - ВАКАРНИ ПРЕПАРАТИ
- ✓ У пролеће, у фази зелене тачке - СИРАМ

Препарати на тржишту:

- ✓ BLAUVIT, BLAUVIT TEČNI
- ✓ ВАКАРНИ ОКСИХЛОРИД-25, ВАКРОЦИД-25, ВАКАРНИ ОКСИХЛОРИД-50, ВАКРОЦИД-50, ВЕВВЕБЛАУ КРЕЋ
- ✓ КУПРАГРИН
- ✓ ПЛАВИ КАМЕН – ЗОРКА, ПЛАВИ КАМЕН – ЖУПА
- ✓ БОРДОВСКА ЧОРБА WP-20, БОРДОВСКА ЧОРБА S-20 ЖУПА
- ✓ СИРАМ S-75, ФИТОСИРАМ
- ✓ Користити нормe третирања из упутства произвођача

Након остварене инфекције заштита није могућа; у том случају спровести мере одржавања кондиције воћки:

- ✓ Прихранити азотом рано у пролеће
- ✓ Заливати биљке током целе вегетације
- ✓ Одстранити плодове да се воћка не исцрпљује



СИМПТОМИ



ОСЕТЉИВА ФАЗА