



ПОЉОПРИВРЕДНА
СТРУЧНА СЛУЖБА
НБАР Д.О.О.
К Р А Љ Е В О

36000 КРАЉЕВО, ЗЕЛЕНА ГОРА БР. 29
ТЕЛ/ФАКС: 036/315-053, 315-054 Е-ПОШТА: pssibar@sbb.rs

АМБРОЗИЈА - Ambrosia artemisifolia L. -

Распрострањеност:

- ✓ аутохтона биљка у САД-у, пренета у Европу 1863.
- ✓ доминантан коров у централној и југоисточној Европи
- ✓ у Србији се најпре раширила у Војводини, данас присутна у скоро целој Републици
- ✓ присутна на необрадивим и обрадивим површинама, у руралним и у урбаним срединама

Алергеност:

- ✓ изазива алергије код 10% светске популације
- ✓ полен садржи шест алергена
- ✓ једна биљка производи више милиона поленових зрна
- ✓ највећа концентрација полена је у августу и септембру, у раним јутарњим сатима и пре подне
- ✓ полен може повољним струјама ветра да доспе и на удаљеност од чак 100 км

Штете:

- ✓ велике штете прави у усевима кукуруза, сунцокрета, соје, грашка, уљане репице и у ређим стрним житима
- ✓ уколико се једном појави а ништа се не предузме, шири се огромном брзином

Сузбијање:

- ✓ отежано због развученог периода ницања
- ✓ обавезно изводити пре цветања амброзије
- ✓ механичке и агротехничке мере:
 - појединачне биљке чупати из корена
 - веће површине треба стално косити пре цветања, и то испод 5 cm од површине земље, како би се спречило обнављање преко бочних изданака
 - запуштена земљишта треба уредити и засејати травом, како би се повећао број конкурентских биљака
- ✓ хемијске мере:
 - на непољопривредним површинама - хербициди на бази а.м. glifosat или а.м. glufosinat-амонијум
 - у кукурузу - после сетве а пре ницања: хербициди на бази а.м. izoksafutol, сам или у комбинацији са препаратима на бази а.м. acetohlor; после ницања (амброзија у фази до 4 листа): хербициди на бази а.м. meztrotrin , а.м. 2,4-D , а.м. dikamba

Законска обавеза:

- ✓ сви приватни власници парцела и корисници јавних површина су у обавези да униште амброзију на свом имању, односно на јавним површинама које користе



Самаила, Јул 2010



Самаила, Јул 2010



Самаила, Јул 2010