



ПОЉОПРИВРЕДНА  
САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА  
КРАЉЕВО Д.О.О.

36000 КРАЉЕВО, ЗЕЛЕНА ГОРА БР.29  
ТЕЛ/ФАХ: 036/315-053, 036/315-054  
Е-ПОШТА: pssibar@sbb.rs

ШЉИВИН СМОТАВАЦ  
- *Cydia funebrana* -

**опис:**

- ✓ Мали тамносив лептир, чија су предња крила мркосиве боје, а на задњем делу је бледо сива мрља у којој су четири црне тачке. Задња крила су једнолично обојена, нешто светлија од предњих.
- ✓ Јаје је ситно и округло, свеже положено је стакласто, а касније постаје бело, затим жуто, а пред пиљење црне боје.
- ✓ Тек испиљена ларва је жута са црном главом. Одрасла ларва је дугачка 10-12 мм, ружичасте боје са мрком главом.

**Биологија и екологија:**

- ✓ У нашим условима развија две генерације годишње.
- ✓ Презимљава као одрасла гусеница у кокону, смештеном у заклоњеном месту испод попуцале коре шљиве.
- ✓ Лептири прве генерације излећу у априлу, мају и почетком јуна. Лет лептири друге генерације почиње од средине јула.
- ✓ Штету причињавају гусенице које се убушују у плод, где достигну пун развој, а потом га напуштају.
- ✓ На месту убушивања ларве у плод јавља се смолоточина, такви плодови потамне и опадају.
- ✓ Највеће штете причињавају гусенице друге генерације, кад плодови достигну потпуни пораст.

**Заштита:**

Прави тренутак за интервенисање против ове штеточине одређује се на основу праћења њеног развића, уз помоћ сексуалних клопки са феромоном. Третирање треба обавити након пиљења гусеница, а пре њиховог убушивања у плод.

За сузбијање шљивиног смотавца могу се користити препарати на бази:

- ✓ Azinfos-metila: (GUSATHION WP-25, у концентрацији од 0,15-0,2 %)
- ✓ Fenitrotiona: (FENITROTION 50-EC, FENIN, FUTOTION EC-50, у концентрацији од 0,1-0,15 %)
- ✓ Acetamiprida: (TONUS, у концентрацији 0,025%)

