

Suzbijanje žilogriza

Žilogriz (*Capnodis tenebrionis*) i šiljokrilac (*Perotis lugubris*) su izuzetno opasne štetočine, koje se pojavljuju u zasadima koštičavih voćaka, izazivajući ogromne štete - sušenje i propadanje pojedinačnih stabala ili celih zasada.. Moraju se suzbijati primenom svih raspoloživih mera, koje imaju preventivni karakter.



Mehaničke mere

Sastoje se u sakupljanju odraslih štetočina ili u sprečavanju ženki da jaja odloži u neposrednu blizinu voćaka odnosno na prizemni deo stabla.

U tu svrhu donji deo stabla i zemljište oko njega prekriva se crnom PVC folijom koja se prekrije zemljištem ili se preko nje stavi PVC mreža sa otvorima prečnika do 2 mm. Jače zaražena stabla treba iščupati sa korenom i obavezno spaliti, a mesto tretirati zemljišnim insekticidom.

Češća površinska obrada i navodnjavanje doprinose smanjenju napada žilogriza.

Agrotehničke mere

Hemijske mjere

Koriste se za suzbijanje odraslih štetočina u vreme njihove ishrane s peteljkom listova, pre polaganja jaja, primenom insekticida - od juna do kraja avgusta meseca.

Larve se suzbijaju primenom zemljišnih insekticida rasipanjem oko voćaka u prečniku do 1 metara oko debla, s tim da se insekticid unese plitko u tlo - u vreme polaganja jaja (treba imati u vidu činjenicu da ženka polaže jaja od početka juna do kraja avgusta meseca).