



# POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА ШЉИВЕ

### 1. ПОЧЕТКОМ ЦВЕТАЊА (као на слици)



У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА УЗРОЧНИКА СУШЕЊА ЦВЕТОВА И ГРАНЧИЦА И ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА КОШТИЧАВОГ ВОЋА (*Monilia laxa*)

На ову болест су посебно осетљиве шљиве сорте Стенлеј и Чачанска родна.

За заштиту од овог паразита препоручује се једно од следећих средстава:

- CHORUS 75-WG.....0,02 % (20 ml u 100 l vode)
- KUBIK.....0,25 % (250 ml u 100 l vode)
- SUMILEX.....0,15% (150 ml u 100 l vode)
- SIGNUM .....0,06% (60 g u 100 l vode)

Наведена средства су фунгициди са локалсистемичним или системичним својствима, а прскање је потребно извести у касним поподневним сатима по тихом времену.

**У периоду цветања је забрањена употреба инсектицида због присуства пчела и др. опрашивача у засаду.**

### 2. У ФАЗИ ПРЕЦВЕТАВАЊА ( као на слици )



У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ШЉИВИНИХ ОСА (*Hoplocampa sp.*), ПЛАМЕЊАЧЕ ШЉИВЕ (*Polystigma rubrum*), РОГАЧА ШЉИВЕ (*Taphrina pruni*)

Сузбијање шљивиних оса треба обавити после пуног цветања (80% цветова прецветало), када пчеле више не посећују цветове.

За заштиту треба применити један од следећих препарата:

- PERFECTION.....0,15 % (150 ml u 100 l vode)
- MEGATRIN 2,5 EC.....0,02 % (20 ml u 100 l vode)
- SIPKORD.....0,03 % (30 ml u 100 l vode)
- NURELL-D.....0,10 % (100 ml u 100 l vode)

Једном од ових препарата треба додати неки од следећих фунгицида ради заштите од пламењаче и рогача шљиве :

- CAPTAN.....0,25 % (250 g u 100 l vode)
- DITHANE .....0,25 % (250 g u 100 l vode)
- ANTRACOL.....0,20 % (200 g u 10 l vode)
- DAKOFLO.....0,20 % (200 ml u 100 l vode)

Ово третирање обавити у касним поподневним сатима по тихом времену.

### НАПОМЕНА

Пре почетка прскања обавезно прочитати приложено упутство за употребу препарата и истог се придржавати.

УЖИЦЕ 12.04.2010.