



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

У ФАЗИ ПЛОД ВЕЛИЧИНЕ ЛЕШНИКА - КАО НА СЛИЦИ

ЗАШТИТА СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ

(*Venturia sp.*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ФУНГИЦИДА:

Контактни фунгициди:

- MANKOGAL.....u konc. 0,25% (250 gr na 100 l vode)
- CAPTAN.....u konc. 0,25% (200 gr na 100 l vode)
- POLYRAM.....u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)
- ANTRAKOLu konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)

У комбинацији са једним од системичних или локалсистемичних фунгицида:

- SCORE.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- STROBY.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- ZATO.....u konc. 0,015% (15 gr na 100 l vode)
- CHORUS.....u konc. 0,02% (20 gr na 100 l vode)
- OLYMP 10 EW.....u konc. 0,030% (30 ml na 100 l vode)

Због повољних услова за развој болести потребно је за заштиту користити комбинацију једног од горе поменутих контактних фунгицида који остају на површини и спречавају настанак заразе са локалсистемцима који улазе у биљку, а који имају деловање и на чађаву краставост и на пепелницу.

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД
СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX 20 SP) u konc. 0,025% (25 gr na 100 l vode)
- NURELL D (ili KONZUL ili ANTHOCID-D) u konc. 0,10% (100ml u 100l vode)
- CALIPSO..... u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- АСТАРАu konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- DIMETOGAL.....u konc. 0,15% (150 gr na 100 l vode)

Установљена је појава лисних вашију у засадима јабуке, а појава лептира јабукиног смотавца прве генерације још није регистрована.

За сузбијање крушкине буве (*Psila pyri*) препорука је да се користи једно од следећих средстава:

- AVASTATE.....u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode)
- VERTIMES.....u konc. 0,075% (75 ml na 100 l vode)

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања.

