



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ **ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ТОКОМ ЛИСТАЊА**

За правилно одабирање изданака малине потребно је да се сачека да се пупољци делимично развију. На овај начин се јасно уочавају оболели и изданци са измрзлим пупољцима који се уклањају. Они са добро развијеним пупољцима се везују за жицу. На дужни метар шпалира оставити 4-5 одабраних изданака. У великом броју засада није урађена пролећна заштита комбинацијом неког од препарата на бази минералног уља и бакарних средстава. Заштита током листања је нарочито важна ако није обављено рано пролећно прркање.

За заштиту од болести одабрати неки од препоручених препарата и то:

- FUNGURAN..... 0,30% (300 г/ 100 л воде)
- CUPROXAT..... 0,35% (350 мл/ 100 л воде)
- CUPRABLAU Z..... 0,35% (350 г/ 100 л воде)
- CAPTAN..... 0,25% (250 г/ 100 л воде)
- AKORD WG..... 0,075% (75 г/ 100 л воде)

Против штетних инсеката у овој фази развоја малине користити неки од препоручених инсектицида:

- CIPKORD или CYTHRIN..... 0,050% (50 мл у 100 л воде)
- TALSTAR 10 EC или FOBOS..... 0,050% (50 мл у 100 л воде)
- AFINEX 0,020 % (20 г/ 100 л воде)
- ABASTATE или VERTIMEK 0,10 % (100 мл у 100 л воде)

Препарати Talstar (ili Fobos) и Vertimek (ili Abastate), поред инсектицидног имају деловање и на малинину грињу (*Phyllocoptes gracilis*).

PRIMENA HERBICIDA U ZASADIMA MALINE

За сузбијање корова препоручује се примена неког од хербицида

- STOMP AQUA2,9 l/ha (третирање земљишта, делује на корове пре ницања)
- FUSILADE FORTE.....1,3 l/ha (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
- FOCUS ULTRA1-3 l/ha (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
- DIQUA TOP ili DESSICASH4-5 l/ha (корови у порасту 5-15 цм)
- BATA 15 ili REGLONE FORTE..3-5 l/ha (корови у порасту 5-15 цм)

Напомена:

- Fusilade forte и Focus ultra се користи за сузбијање само усколисних корова који су изникли и у порасту 10-15 цм. На малину и на широколисне коровске врсте нема хербицидно деловање.
- Basta, Reglone forte, Diqua top ili Dessicash су контактни хербициди који се примењују на изникле корове пораста 5-15 цм. Мање количине хербицида су потребне ако доминирају широколисни, а веће количине за сузбијање усколисних корова. Хербицид се усваја листом и надземним деловима корова.