



# OBAVEŠTENJE

POLJOPRIVREDNA SRUČNA SLUŽBA NOVI PAZAR D.O.O.

## OBAVEŠTAVAMO POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – VOĆARE

Mere jesenje nege zasada voćaka u šta spadaju mehaničke i hemijske mere zaštite treba obaviti u novembru mesecu čim vremenske prilike dozvole.

Jedna od osnovnih mera u zaštiti voćaka od štetočina i bolesti je rezidba.

Zato treba ukloniti :

- stare, obolele i polomljene grane,
- "bele" mladare (pepelnica),
- grane zahvaćene *Erwinia amylovora*  
(crne boje grane – bolest bakteriozna plamenača jabuke, kruške, dunje - odseći 40-60cm od zaraženog mesta),
- protresti voćke kako bi se oslobodile 2/3 lišća u slučaju da nije opalo,
- sakupiti mumificirane i zaostale plodove iz krošnje i sa zemlje ispod voćke;

Sve ove biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti.

Poželjno je da se metalnom četkom ili posebnim strugačama sa starijeg debela voćke i ramenih grana ostruže stara kora, mahovina, lišajevi i gnezda gusenica koje su tu našle zimsko sklonište.

Krečenje stabala obavezno se radi u jesen i to je mera čiji je cilj ublažavanje posledica niskih temperatura. Za pripremu krečne čorbe potrebno je sledeće: 5kg negašenog kreča, 0.5kg kuhinjske soli i 0.250 sumpora (Tiovit Jet). Sve pomešati i zagasiti vodom tako da smeša bude konzistencije mleka. Smeša treba da odstoji dva dana i tada primeniti.

Obavezna mera tokom jeseni je i hemijsko tretiranje voćaka tkz.

*"plavo prskanje"* kojim se suzbijaju uzročnici mnogih bolesti.

**U tu svrhu preporučujemo sledeće preparate:**

Bordovska čorba (1.5-2%), Blauvit (1%), Bakarni oksihlorid 50 (0.75%),

Kupragin (0.35%), Cuproxsat (0.35%)

Jesenjim *"plavim prskanjem"* bakarnim preparatima se postiže denzifikacija voćnih stabala od prezimljavajućih formi pojedinih štetočina (štitastih vaši, grinja, pregljeva), bakterijskih oboljenja, gljivičnih oboljenja (u vidu micelija, spora).

*Dipl. ing. Svetlana Šučević*