



OBAVEŠTENJE

POLJOPRIVREDNA SRUČNA SLUŽBA NOVI PAZAR D.O.O.

PRENAMNOŽENOST POLJSKIH GLODARA

ŠTETNI GLODARI (POLJSKI MIŠ, MIŠ HUMKAŠ, ŽUTOGRLI MIŠ, POLJSKA VOLUHARICA, VODENA VOLUHARICA, HRČAK), TJ. NJIHOVA PRENAMNOŽENOST ,MOGU DA UGROZE NE SAMO PROIZVODNJU POJEDINIH KULTURA, NEGO I UKUPNU BILJNU PROIZVODNJU.

INTENZITET NAPADA SE ODREĐUJE NA OSNOVU BROJA AKTIVNIH RUPA PO JEDNOM HEKTARU. PROVERA AKTIVNOSTI RUPA IZVODI SE NA TAJ NAČIN ŠTO RUPE ZATRPAMO ZEMLJOM A SUTRADAN OBIĐEMO DA UTVRDIMO KOJE SU OTKOPANE I U NJIH POSTAVLJAMO MAMCE.

UKOLIKO NA JEDNOM HEKTARU POSTOJI VIŠE OD 500 AKTIVNIH RUPA, TADA SE PRISTUPA ZAŠTITI USEVA I TO JEDNIM OD SLEDEĆIH PREPARATA, RAZBACIVANJEM MAMAKA U AKTIVNE RUPE PO UPUTSTVU PROIZVOĐAČA PREPARATA:

GARDENTOP, BRODILON PELETE, BRODISAN-A,
GALIBROM-AB, SURADIOLON ZRNA,
CINKFOSFID MAMAK, CINKOSAN, ZORADIOLON MAMAK.

U LUCERIŠTIMA OBAVEZNO JE PRAĆENJE BROJNOSTI POLJSKIH MIŠEVA I VOLUHARICA. ZAŠTITI POLJA POD LUCERKOM OD GLODARA PRISTUPA SE TEK AKO IMA VIŠE OD 500 AKTIVNIH RUPA NA JEDNOM HEKTARU ISTIM PREPARATIMA KAO ZA STRNA ŽITA.

VOĆNJACI SU OSETLJIVI NA ŠTETE OD GLODARA. NEOPHODNO JE ODREDITI O KOJIM GLODARIMA SE RADI ŠTO JE VAŽNO ZA IZBOR MERA ZAŠTITE. OŠTEĆENJA KORENA I KORE ISPOD POVRŠINE NAJČEŠĆE PROUZROKUJU MIŠEVI. ZAŠTITI OVE ŠTETOČINE SE PRISTUPA UKOLIKO JE BROJ AKTIVNIH RUPA OD 10 DO 50 PO JEDNOM HEKTARU. SUZBIJANJE SE IZVODI U ZIMSKOM PERIODU KADA NEMA PLODOVA.

POSTAVLJANJE MAMACA OBAVITI PO SUVOM VREMENU I TO NAPRED NAVEDENIM PREPARATIMA

MLADE ZASADE TREBA OBAVEZNO ZAŠTITITI OD ZEČEVA I DRUGIH ŽIVOTINJA STAVLJANJEM ZAŠTITNE MREŽE ILI PREMAZIVANJEM KORE REPELENTIMA KOJI SVOJIM NEPRIJATNIM MIRISOM I UKUSOM ODBIJAJU ŽIVOTINJE.

DIPL.ING.POLJ. SVETLANA ŠUĆEVIĆ
ZAŠTITA BILJA