

“Poljoprivredna Stručna Služba Šabac“doo
Šabac, Vojvode Putnika 26
Telefon:015/301-820

E mail.psssabac@gromnet.net

Datum:20.07.09.

Obaveštenje:

Zaštita krastavca od plamenjače

Plamenjaču krastavca prouzrokuje fitopatogena gljiva *Pseudoperonospora cubensis*. Nanosi najviše gubitke u proizvodnji, i u poređenju sa drugim bolestima krastavca javlja se u uslovima toplog ivlažnog vremena.

Simptomi se mogu javiti na prvim stalnim listovima krastavca. Pege su u vidu limunastih, svetlozelenih okruglih krupnih pega, koje su oivičene nervima i imaju poligonalni uglast izgled. Pege se postepeno šire, u uslovima visoke vlažnosti na naličju lista u okviru pega se može uočiti siva prevlaka od spore gljiva.



Simptomi plamenjače na licu i naličju

Kod jakog napada može doći do uginuća biljka. Zbog nekroze i sušenja listova veća je izloženost plodova suncu što dovodi do pojave ožegotina.

U suzbijanju plamenjače primenjuju se preventivne i hemijske mere.

Preventivne mere :

- Izbor sorti i hibrida tolerantnih ili otpornih na ovu bolest

Hemijske mere

- Prskanje fungicidima izvoditi već od faze pojave prvih listova i tada ima preventivni karakter
- Fungicidi koji se preporučuju u fazi 2-3 lista i uopšte vegetativnog prirasta su PREVICUR 607 SL, PREVICUR ENERGY, ANTRACOL, DAKOFLO SC, BRAVO, ALLIETE FLASH
- I u fazi plodonošenja mogu se koristiti samo preparati kratke karance ALLIETE, FOLIET, QUADRIS

POSEBNO VODITI RAČUNA O KARENCI PREPARATA KADA JE KRASTAVAC U FAZI PLODONOŠENJA!

dipl.ing. Jasmina Jocković